

# 新型コロナワクチン接種のお知らせ

## [65歳以上の方へ]



新型コロナワクチンを接種するために必要な接種券をお送りします。

接種を希望する方は、以下の手続で接種を受けていただきます。

※この通知は、令和3年度中に満65歳以上になる方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）へ送付しています。

### ワクチン接種までの流れ



#### ①接種場所を確認する

- 原則として、接種できるのは北谷町内にて個別接種を実施する医療機関や集団接種の会場（ちゃたんニライセンター予定）のみです。町外での接種については裏面を御覧ください。
- 北谷町内で接種できる医療機関や接種会場は、北谷町のホームページ（HP）などでお知らせする予定です。



#### ②予約する

- 医療機関での接種を希望する方は医療機関に直接予約、集団接種の会場での接種を希望する方は北谷町のコールセンターへお電話ください。
- ※ただし、ワクチンの供給量や接種体制によっては、御予約をお待ちいただく場合があります。



#### ③接種を受ける

- ワクチン接種の当日は次のものを御持参ください。

当  
日  
の  
持  
ち  
物

①同封の接種券

②同封の予診票（1回目は黄色、2回目は緑色です。）

③本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）

### 注 意 事 項

※接種前に御自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控え、予約先に御連絡ください。

※肩を出しやすい服装（肩の筋肉内に接種します。）でお越しください。

※同封の接種券は、予診票に貼りつけたり、切り離したりせずにそのまま医療機関や接種会場にお持ちください。

※同封の予診票は、事前に記入の上、お持ちください。



北谷町のコールセンターのお問い合わせ先は裏面を御覧ください



# 基礎疾患等のある方へ

基礎疾患のある方や過去に予防接種を受けてアレルギーを起こした方は、あらかじめワクチン接種を受けて良いか、かかりつけ医に御相談ください。

## 町外でのワクチン接種について

主に、次に該当する方は、町外の医療機関や会場で接種できる場合があります。

### ①町外の医療機関や施設に入院または入所中の方

- ・医療機関や施設で御相談ください。

### ②基礎疾患治療のため町外の医療機関に通院されている方

- ・医療機関で御相談ください。

### ③お住まいが住所地と異なる方

- ・実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせいただきか、コロナワクチンナビで御確認ください。



「コロナワクチンナビ」

## ワクチン接種には御本人の同意が必要です

- ・ワクチン接種は強制ではありません。発症予防の効果と副反応のリスク双方を理解した上で、自らの意思で受けていただきます。受ける方の同意なく接種が行われることはできません。

## 接種するワクチンの種類について

- ・ファイザー社製新型コロナワクチン（商品名：コミナティ筋注）

※ワクチンの効果などについては同封の「新型コロナワクチンの説明書」を御覧ください。



北谷町

<http://www.chatan.jp>



「北谷町HP」

## 北谷町新型コロナワクチン接種センター

電話番号 (098) 923-0990

F A X (098) 936-4440

受付時間 平日8:30~17:00 (12:00~13:00を除く)



# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）



妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。  
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になつたり障害が残つたりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ ALC-0315：[（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル]ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◆ ALC-0159:2-[（ポリエチレンギリコール）-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

