

## 移動支援事業

移動手段のない方は、富加町社会福祉協議会の行っている移動支援事業が利用できます。利用できる人数に限りがありますので、ご了承ください。ご利用をご希望の方は、ワクチン接種の予約の際に、お申し出ください。※送迎は町内のご自宅から富加町保健センターまでの間となります。

## コールセンターのご案内

### ●新型コロナウイルスワクチンコールセンター（厚生労働省）

電話番号：0120-761-770 / 受付時間：9時00分～21時00分（毎日）

### ●新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（岐阜県）

電話番号：058-272-8222 / 受付時間：9時00分～21時00分（毎日）

## 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

・コロナワクチンナビは接種会場や接種日程を確認するためのサイトです。

・コロナワクチンナビは、3月下旬以降に使用できる予定です。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>



「コロナワクチンナビ」  
二次元コード



## 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナウイルスワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、福祉保健課にご相談ください。なお、通常の予防接種でも起こりうる軽微な副反応については、救済の対象外となることがあります。

スムーズな接種の実施のため、さまざまな事（予約、当日の体温計測、服装等について）をお願いいたしますが、ご協力のほどよろしくお願ひいたします。



新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問い合わせ先 富加町役場 福祉保健課 54-2117

ファイザー株式会社 「新型コロナワクチン コミナティを接種される方とそのご家族へ」より抜粋

## 保存版

# 新型コロナワクチン接種のお知らせ

## ワクチン接種までの流れ

接種費用

無料

（全額公費）

### 1 接種券（クーポン券）・予診票が郵送されます

65歳以上の高齢者（令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前生まれの方）の方に郵送しています。

クーポン券イメージ図

### 2 ワクチン接種の予約をします

- ・ワクチン接種の日程は現在、決定していませんので、まだ予約受付はできません。決定次第、広報やホームページ、広報無線などでお知らせします。
- ・集団接種で、水・木・土曜日の午後を予定しています（変更する場合もあります）。
- ・同じ時期に、先行して高齢者施設の入所者および従事者への接種も開始されます。
- ・予約の際は、お手元にクーポン券をご用意ください。
- ・接種の候補日は複数ご用意ください。

予約受付開始後に  
お電話ください。

町の接種会場（保健センター）

予約電話受付

福祉保健課

0574-54-2117

### 3 予診票を記入する

接種の日までに、予診票を記入しておきます。

ワクチン接種には同意が必要です

接種の同意がある場合に限り、接種を行うことになります。また、接種は強制ではないため、希望されない場合には、接種は行いません。

### 4 ワクチンの接種を受ける

- 1) 接種当日に、ご自宅で体温を測定し、予診票に記入します。

※発熱している時は、接種できません。福祉保健課へお早めにキャンセルの連絡をお願いします。

- 2) 予約した日時の少し前に、保健センターにお越しください。

- 3) 保健センターに入る前に、再度検温を行います。

- 4) 受付にて予診票の確認を行います。

- 5) 医師の診察をうけます。

※受付・診察の状況によりお待ちいただくことがあります。

- 6) 新型コロナワクチンを、左右どちらかの肩に筋肉注射します。

★肩を出しやすい服装でお越しください。

- 7) 接種後は経過観察室にて、15～30分の経過観察を行います。


- 8) 一定の時間が経過したら、接種済証を受け取り、終了となります。

★おおよそ1人あたりの所要時間は45～60分程度を想定しています。

時間に余裕を持ってお越しください。


当日の  
持ち物

- ・接種券（クーポン券）（台紙ごとお持ちください）
- ・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
- ・予診票



## 【接種会場のご案内】

富加町保健センター（富加町役場・南）



## ワクチンの接種回数

2回接種する必要があります。1回目の接種から3週間後の同じ曜日が、2回目の接種日となります。

## ワクチンの有効性

- ・新型コロナウイルス感染症の発症を予防するものです。
- ・ワクチン接種後も基本的な感染予防対策（マスク着用、3密の回避、手洗いなど）が必要です。
- ・ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度と考えてください。

## ワクチンの成分

有効成分	トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きをもつスパイク蛋白質の全長体をコードするmRNA)
添加物	ALC-0315: [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル)、ALC-0159: 2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド、DSPC: 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、コレステロール、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム二水和物、精製白糖

## ワクチンの副反応

接種後（特に、接種直後～数日間）はご自身の体調に注意しましょう。接種会場では、下記のような症状やいつもと違う体調の変化や異常があれば、ただちに看護師、保健師にお声がけください。帰宅後に異常な症状が現れた場合は、かかりつけ医や町の相談窓口にご相談ください。

## 起こるかもしれない重い症状（頻度不明）

- ショック、アナフィラキシー

【症状の発現状況、時期、持続期間など】

ワクチン接種直後から、時には5分以内、通常30分以内に以下の症状が現れた場合、ショック、アナフィラキシーの疑いがあります。

- 皮膚症状：皮膚のかゆみ、じんま疹、紅斑、皮膚の発赤など
- 消化器症状：腹痛、吐き気など
- 視覚症状：視野の異常
- 呼吸器症状：声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさなど
- ショック症状：蒼白、意識混濁など

## 起こるかもしれないからだの症状（接種を受けた方の10%以上に起こったもの）

- |                |            |      |       |
|----------------|------------|------|-------|
| □ 注射した部位の痛み、腫れ | □ 頭痛       | □ 下痢 | □ 疲労感 |
| □ 寒気、発熱        | □ 筋肉や関節の痛み |      |       |

【症状の発現状況、時期、持続時間など】

●注射した部位の痛みの多くは接種当日に現れ、持続時間は約2日でした。その他の症状の多くは接種翌日に現れ、持続期間は約1日でした。

※先行接種では、接種翌日には9割の方が痛みを自覚したが、接種3日後には軽快したと報告されています。

●これらの症状の多くは、1回目の接種より、2回目の接種時に高い頻度で認められました。また、高齢者よりも非高齢者に高い頻度で認められました。

●これらの症状は、通常、数日以内に治まります。なお、病気の治療中の方で解熱消炎鎮痛剤などを使用される場合は、主治医・薬剤師に服用についてご相談ください。また、接種部位のひどい痛み・腫れ、高熱など重い症状と思われる場合は、医師の診察を受けてください。

## ワクチン接種当日までについて

- ・原則として、ワクチン接種は体調のよい時に受けましょう。
- ・持病があり、定期的に受診している方は、ワクチン接種までに、ワクチン接種について主治医に相談しておきましょう。特に、アレルギー疾患のある方は、必ず主治医やかかりつけ医に相談しましょう。
- ・接種当日は、左右どちらかの肩に接種（筋肉注射）を行います。肩を出しやすい格好（Yシャツや半袖のうえに上着や羽織を着るなど）でお越しください。

## 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方

→ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村窓口または町の相談窓口にお問い合わせください。



## ワクチンを接種してからの過ごし方

- ・接種を受けた後しばらくの間は、接種を受けた会場でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに接種会場のスタッフに申し出てください。
- ・注射した部位は清潔に保ちましょう。
- ・接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部位はこすらないようにしましょう。
- ・当日の激しい運動は控えましょう。