


■接種を受けた後の注意点

- ①本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神などを起こしたりしたことがある方は30分以上）、文化センターホール内の椅子に座ってお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかにスタッフへお申し出ください（急に起こる副反応に対応できません）。
- ②注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- ③当日の激しい運動は控えてください。



■副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医師あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

■予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています（厚生労働省が認めた場合）。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、役場町民課健康づくり係にご相談ください。

【お問い合わせ先】

寿都町役場 町民課健康づくり係（☎0136-62-2513）



必ずお読みください



新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社製）

■ワクチンの効果と投与方法

現在供給されているワクチンは、ファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防します。ワクチンを受けた人の方が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-Co-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上
接種量	1回0.3mlを合計2回

■予防接種を受けることができない方

- ①明らかに発熱（37.5℃以上）している方
- ②重い急性疾患にかかっている方
- ③本ワクチンの成分*に対して重度の過敏症（アナフィラキシーや呼吸困難など）の既往歴のある方
- ④上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

*本ワクチンの成分については、ファイザー株式会社のホームページ等でご確認ください。

■予防接種を受けるに当たり注意が必要な方

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前にかかりつけ医にご相談ください。

- ①血が止まりにくい病気の方や、血をサラサラにする薬を飲んでいる方
- ②心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、免疫不全などの基礎疾患のある方
- ③過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- ④過去にけいれんを起こしたことがある方
- ⑤本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方

裏面もご覧ください