

新型コロナワイルスワクチン接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)

新型コロナワイルスワクチンの予防接種がはじまります。

新型コロナウイルス感染症予防と、感染症による重症化予防を目的とした、予防接種が始まります。この通知は、高齢者の方に送付をさせていただいております。高齢者以外の市民の皆様につきましては、國の方針に基づき、順次個別にご案内をさせていただきます。

接種についてご理解、ご検討いただきたいこと

新型コロナワイルスワクチンの接種は、強制ではありません。

接種を受ける方（ご本人）の同意がある場合に限り接種を行うことになります。

（ご本人の同意なく、接種が行われることはできません。）

ご本人の意思確認が難しい場合は、ご家族の協力や、かかりつけ医への相談をお願いいたします。また、職場、周りの方や、近所の方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

※現在、何かの病気で治療中の場合や、体調や接種について不安がある場合は、かかりつけ医療機関などにあらかじめ受診をし、接種について医師にご相談くださいますようお願いいたします。

対象となる方
(高齢者の方)

令和3年度中に65歳に達し（昭和32年4月1日生まれ以前）、
下田市に住民票がある方。

接種回数

ひとりにつき2回

接種費用

無料

接種方法

集団接種（原則として、住民票のある市町村での接種です。）

※ワクチンの供給状態による接種のため、当面の間は集団接種を中心に行います。

接種会場

下田市民スポーツセンター（サンワーク下田）（〒415-0037 下田市敷根761番地）

※市が設置をする、特設会場での実施です。

※伊豆急下田駅から接種会場までの往復のシャトルバスがあります。ご利用を希望される方は、接種の予約時にご予約を承ります。

送付内容(この封筒の内容物と説明)

① 接種券「新型コロナワイルスワクチン接種のご案内」(1枚)

※接種券にはご本人の氏名や住所、生年月日などが記載されています。ご確認ください。

② 新型コロナワクチン接種の予診票(2枚)

※接種券や予診票は、予防接種を行う際に使用します。

※接種券ははがしたり切り取らず、接種を行う日まで大切に保管をお願いいたします。

③ 説明書(ファイザー社製)(1枚※両面)

予防接種で使用するワクチンや、予防接種による感染症予防の効果と副反応、接種後の注意点などに関する説明書です。予防接種を受けるにあたり、効果と副反応のリスクの双方について理解をしていただくことが大切です。なお、予防接種を受けることができない、又は予防接種を受けるにあたり、注意が必要な方については、あらかじめ医療機関を受診し、医師にご相談ください。

④ 集団接種の予約方法と、血をサラサラにするお薬を飲まれている方へ(1枚※両面)

【表面】集団接種の予約方法～予約受付センターに接種の予約をお願いいたします。～

集団接種を受けるには、事前にコールセンターへの予約が必要です。

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、市役所窓口での予約は行っておりません。

ご了承ください。

【裏面】「血をサラサラにするお薬を飲まれている方へ」

予診票での問診事項に、お薬の種類をおたずねしています。

血液をサラサラにするお薬を飲まれている場合、接種後に血が止まりにくくなる場合があります。

該当となるお薬を飲まれている方は、かかりつけ医師に接種についてご相談ください。

※裏面は予防接種を受けるまでの流れの説明です。必ずお読みください。

接種までの流れ

① 接種券が届きます。(このお知らせに同封されています。)

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさずに台紙ごとお持ちください。

② 接種の予約を行います。

集団接種の予約方法 予約受付センターに接種の予約をお願いいたします。

③ 予約後、「接種予約済票」(ハガキ)が届きます。

※このハガキは接種時に必要です。なくさないように保管をお願いいたします。

④ 接種を受けます。

接種当日の服装や、準備していただきたいこと

※接種前の診察があります。着脱しやすい服装でお願いいたします。

腕に接種をします。肩を出しやすい服装でお越しください。

※マスクを着用のうえ、ご来場ください。

※会場での速やかな接種を行う目的で、予診票はあらかじめ必要事項を記載ください。

当日の持ち物

※持ち物を忘れた場合、接種が出来ないことがあります。
お出かけになる前に、必ずご確認ください。

① 接種券 ② 予診票 ③ 本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

④ 接種予約済票 ⑤ おくすり手帳(ある方のみ)

接種会場での接種のながれ

受付

① 接種券 ② 予診票 ③ 本人確認書類 ④ 接種予約済票 ⑤ おくすり手帳(ある方のみ)
を提出します。

検温

予診について ※当日の予防接種の可否について、医師が判定します。

医師による予診(接種前の診察)を行います。当日の予診で異常が見られる場合や
体調が悪く、接種を見合せた方が良いと医師が判断した場合、接種が中止となることがあります。
当日、接種会場で接種が出来なかった方については改めて接種の予約に関するご案内をさせていただきます。

予診票確認

接種後の待機

接種後の急な体調不良に対応するため、接種後は15分から30分、接種会場で着座の状態で
待機をしていただきます。待機時間の間に、接種済証の発行と、接種後の注意点に関する
パンフレットをお渡しします。また、1回目の接種後は、2回目の日程の確認もあわせ行います。

待機

帰宅

新型コロナワイルスワクチン予防接種についての説明書 (ファイザー社製)

※ 必ずお読みください。※

新型コロナワイルスワクチン予防接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン接種事業の一貫として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは、16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は95%と報告されています。)

販売名	コミナティ® 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、3週間の間隔) ※ 筋肉内に接種
接種対象	16歳以上(16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回 0.3mL を合計 2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。
(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染症防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人 (※1)
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症 (※2) の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは、通常 37.5°C 以上を指します。ただし、37.5°C を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状・喘鳴・呼吸困難・頻脈・血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
(裏面もご覧ください。)

ファイザー社製

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。また、本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加物が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状症状を起したことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起したりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、新しいワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	☆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	☆ ALC-0315 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ピス(ヘキサン-6,1-ジイル) ピス(2-ヘキシリデカン酸エステル) ☆ ALC-0159 : 2-[(ポリエチレングリコール) -2000]-N, N-ジテトラデシルアセトアミド ☆ DSPC : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ☆ コレステロール ☆ 塩化カリウム ☆ リン酸二水素カリウム ☆ 塩化ナトリウム ☆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ☆ 精製白糖