

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

新型コロナウイルスワクチン接種について

- 本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。
- 本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。
- 今回接種するワクチンは、メッセンジャーRNAワクチンという新しい種類のワクチンです。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。
(発症予防効果は約95%と報告されています。)

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、3週間の間隔)※通常、三角筋(上腕の筋肉)に、筋肉内注射という方法で接種します。
接種対象	16歳以上(16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチンを接種してください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかるらず、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。
※ワクチンには感染を防ぐ「感染予防」と、感染しても発症を防ぐ「発症予防」がありますが、今回のワクチンで現時点ではっきりしているのは「発症予防」の効果です。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、じんま疹などの皮膚症状、息苦しさなどの呼吸器症状、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

- 妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳中の人

※本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	☆トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするメッセンジャーRNA)
添加物	☆ALC-0315: [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシリデカン酸エステル) ☆ALC-0159: 2-[ポリエチレングリコール]-2000-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ☆DSPC: 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ☆コレステロール ☆塩化カリウム ☆リン酸二水素カリウム ☆塩化ナトリウム ☆リン酸水素ナトリウム二水和物 ☆精製白糖

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応するためです。)
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

◎ 次のような症状が現れることがあります。

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10 - 50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1 - 10%	吐き気、嘔吐

- インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方がいます。
- これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- 疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。

コミナティ®添付文書より改編

◎ 接種後すぐに現れる可能性がある症状について

▶ アナフィラキシー

- ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
- ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。
- ・起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医療品などの準備をしています。

▶ 血管迷走神経反射

- ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。
- ・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。
- ・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子を見てください。

※なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市区町村等にご相談ください。



8 接種場所について

▶ 医療機関での個別接種について

- 接種を希望される医療機関へ、直接電話で予約してください。（コールセンターで予約はできません）
 - 予約開始は5月17日（月）から、接種開始は5月24日（月）からです。

※上記日程は各医療機関により、変更になる場合があります。また、ワクチン入荷状況により延期になる場合があります。

詳しくは、医療機関にお尋ねください。
※現在通院中の方は、まずはかかりつけ医

予約時間について記載がない医療機関は、診療時間内に予約をしてください。

～予約時間について記載がない医療機関は、診療時間内に予約をしてください。

● 医療機関一覧

※祝日は実施していません

医療機関名	所在地	予約電話番号	備考
青山クリニック	東刈谷町	62-5673	
あらわら内科クリニック	中手町	28-0881	
飯島内科医院	小山町	21-0944	
石川内科	小堀江町	21-0135	
一里山・今井病院	一里山町	26-6709	
ワインズヘルスクリニック刈谷銀座	銀座	70-7801	
大杉医院	一ツ木町	23-4151	
大竹耳鼻喉科クリニック	大手町	23-3341	※予約は10時～11時30分(月・火・水・金)
西大内科クリニック	今岡町	36-7711	※予約は9時～11時30分(月～土)
小垣江こどもクリニック	小垣江町	27-2400	
おなじとおじいのすずきクリニック	中山町	45-5511	※予約は13時～16時(月・火・木・金)
兼子どもクリニック	半城土西町	62-1313	
刈谷記念病院	小堀江町	21-0123	※予約は9時～17時30分(月～金)
刈谷銀座かどと内科クリニック	銀座	23-2101	
刈谷なりたクリニック	松栄町	63-5677	
高藤眼科	高倉町	25-7100	
酒井内科医院	丸田町	21-2326	
神津内科	寺横町	21-3151	※予約は14時～14時45分(月・火・水・金・土)
さくらこどもクリニック	神明町	62-6500	
戸穴皮フ科クリニック	広小路	62-5501	
耳鼻咽喉科のむらクリニック	山田町	62-8733	※予約は9時30分～11時30分(月・火・水・金)
耳鼻科クリニックの高須	井手谷町	61-1133	※予約は前日01時00分まで
ジョンソンデイズクリニック刈谷	末広町	24-0306	※予約は9時～12時(女性のみ)(月～金)
すがねま耳鼻咽喉科	野寺町	29-3387	
杉浦医院	東町	36-5408	※予約は12時～12時30分(月～土)、16時～16時30分(月・火・水・金)
世古口クリニック	八幡町	29-0223	※予約は10時30分～11時30分(月・火・水・金・土)、17時～18時(月～金)
たかくら小児クリニック	高倉町	63-6321	
谷口クリニック	今川町	91-7618	
田和小児科医院	東陽町	21-2332	
辻内科循環器科クリニック	松栄町	62-1678	※予約は10時～11時(月・水・金)
辻外病科医院	舟ヶ谷町	36-5200	※予約は13時～17時(月～金)
つづきクリニック	一ツ木町	63-6102	
中野医院	泉田町	21-1161	※予約は11時～12時、17時～18時(月～土)
野町駅メディカルクリニック	野町	23-2288	
野村内科	半城土中町	21-2511	
半城土とよやすクリニック	半城土西町	63-5051	
はせがわ内科クリニック	一ツ木町	27-7200	※予約は10時～12時(月・火・水・金・土)、16時～18時(月・火・木)
東刈谷八木医院	南沖野町	21-1551	

〈3ページへ続く〉

医療機関名	所在地	予約電話番号	備考
広瀬クリニック	若松町	24-6622	
ひろせ内科	西横町	61-8887	
深谷皮膚科	高倉町	27-3110	
まついこどもクリニック	一ツ木町	21-7800	
松本クリニック	高松町	21-5757	
みやち内科	住吉町	29-4110	

●下記の刈谷豊田総合病院と刈谷豊田東病院は、入院中及び通院中の方のみ申し込みを受け付けます。それ以外の方は受けできません。お問い合わせは下記電話番号へお願いします。

施設名	所在地	電話番号	備考
刈谷豊田総合病院	住吉町	25-8158	*予約は9時～15時（月～金）
刈谷豊田東病院	野田新町	62-5276	*予約は13時～16時30分（月～金）

▶ 集団接種について

① 注意事项

- * 場所は、刈谷市保健センターです。(所在地:若松町3-8-2 総合健康センター1階)
 - * 事前予約が必須です。受付は6月5日(土)午前9時から開始します。
 - * 密集・密接を避けるため、人数を区切つてご予約枠で設定しています。また、駐車場台数にも限りがあります。必ず予約した受付時間にお出ください。
 - * 介助が必要な場合は、お名前を除くすべての接種者ご本人のみでお越しください。

② 日

※8月以降も実施予定です。日程につきましては、決まり次第随時「刈谷市ホームページ」等でお知らせします。
※ワクチン入荷状況等により、中止になる場合もあります。

9 住民票がある場所(住所地)以外での接種について

やむを得ない理由がある場合、住民票所在地以外での接種が可能で。事前に申請が必要な方と、不要な方があります。事前申請が必要な方は、「住所地外接種届」を提出する必要があります。接種する医療機関が所在している市町村の窓口へご連絡ください。※申請先は刈谷市ではありません。

対象者	事前準備
・入院中の方、施設入所中の方	
・基礎疾患 ^{※1} を持つ方が住民の医師の下で接種する場合	
・災害による被害にあつた方	不 要
・勾留または留置されている方、受刑者等	
・里帰り中の妊娠婦・単身赴任者・通隔地へ下宿している学生等	必 要
※1 基礎疾患	
・慢性的の病気(呼吸器・心臓病(高血圧を含む)・腎臓病・肝臓病(肝硬変等))	・染色体異常
・インスリノーリ依赖性糖尿病で毎日の中絶病歴または他の病気を併存している糖尿病	・重症化身障害
・血栓の病歴(大動脈・脳血管・深部静脈等)	(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
・血栓の病歴(大動脈・脳血管・深部静脈等)	・難聴(両耳の聴覚機能が失なれており、言語理解能がない)
・血栓の病歴(大動脈・脳血管・深部静脈等)	・重複精神疾患(精神疾患の治療のために服用している精神疾患と他の精神疾患を併存している。又は自己立替療育(精神疾患医師)で(重複かつ複数)に該当する場合)や初回の障害(教育育成を受け持っている場合)
・スライドなど、免許の権限を行使せざるを以て受け取っている方	・基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
・免許の権限を行使せざるを以て受け取っている方	
・精神疾患 ^{※2} や精神障害が原因で個々の機能が衰えた状態(呼吸障害等)	