

しじょうなわてし
四條畷市

しんがたころなういるす
新型コロナウイルス
わくちんせつしゆ しら
ワクチン接種のお知らせ



わくちんせつしゆ なが
ワクチン接種までの流れ

1 接種券を受け取る

高齢者(昭和32年4月1日以前に生まれた人)に関しては、5月19日から順次接種を予定しています。
同封している、接種可能医療機関一覧を確認し、予約をしてください。

2 予約をする (令和3年5月12日(水)正午から受付開始)

医療機関での接種でも、他の予防接種と異なり、必ず事前予約が必要です。
予約には、接種券に書かれた券番号が必要なため、同封の接種券をご用意のうえ、予約をお願いします。
家族などが代理で申し込むことも可能です。
(手続きの詳細は、同封の「四條畷市新型コロナウイルス感染症予防接種予約方法のお知らせ」をご確認ください。)

Webで予約

24時間
受付



○ ワクチン接種予約サイトにアクセスする

<https://jump.mrso.jp/272299/>



LINEで予約

24時間
受付

○ LINEで「四條畷市」を友だち追加

四條畷市の公式LINE
登録はこちらから



電話で予約

四條畷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0570(007)355(ナビダイヤル)

午前9時～午後5時(5月は土・日・祝日含む)

※状況により、6月も土・日・祝日の受け付けを検討中。

FAXまたはメールで予約

言語・聴覚障がいなどにより
電話が難しい人はFAX・メールも使用できます。

FAX:072(877)6963

メール:corona-vaccine@city.shijonawate.lg.jp

3 ワクチンを接種する 無料

当日の持ち物

□ 接種券 □ 記入済みの予診票

□ 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)

- 左記、「当日の持ち物」を持参し、予約した接種会場・医療機関へ
- 医師の間診を受ける
- 本人の同意のもと接種を受ける

上腕部にワクチンを打ちます。肩を出しやすい服装で来てください。

しじょうなわで、ししんがたにころなういるすよほうせつしめ
四條畷市新型コロナウイルス予防接種

せつしめかのう いりょうきかんりすと
接種可能な医療機関リスト

あべくりクリニック	しじょうなわで、したわらだい 四條畷市田原台5-17-21
イトウ・クリニック	// たわらだい 田原台4-4-24
きだいクリニック	// なんこう 楠公2-8-10
きたがわちんじいびょういん 北河内藤井病院	// つかやまひがし 岡山東3-1-6
こうのいいん 河野医院	// なんこう 楠公2-10-12
さかいクリニック	// つかやま 岡山5-1-20
たかつきないか 高月内科	// つかやま しえもあしのぶが 岡山1-8-30 シエモア忍ヶ丘
たけよしけいげい 竹吉整形外科	// つかやまひがし 岡山東1-10-5
たなかいいん 田中医院	// つかやま 塚脇町5-3
てっせいかいのうしんけいげい かびょういん 囃生会脳神経外科病院	// なかのほんまち 中野本町28-1
なかむらクリニック	// かりやにしまち 雁屋西町2-10
なかむらしんりょうじょ 中村診療所	// なかの 中野1-3-1
にしむらクリニック	// なんこう 楠公1-14-6 梨岡ハイツ1階
はやしなにかいいいん 林内科医院	// つかやまひがし 岡山東2-1-23
はんなきなとりうむ 阪奈サナトリウム	// かみたわら 上田原613
ふくだいいん 福田医院	// つかやま 岡山2-1-58
ふくだクリニック	// なかのほんまち 中野本町8-39
まつやまがんかくりクリニック 松山眼科クリニック	// なんこう 楠公2-9-11
まつよしいいん 松吉医院	// こめさきやう 米崎町17-30
みやいファミリークリニック	// えせひら 江瀬美町12-3
みやさきクリニック	// なんこう 楠公1-15-8 2階

じょうき いりょうきかん よやく し いっかつ う つ おこな いりょう
 ※上記の医療機関の予約については、市が一括して受け付けを行っておりますので、医療
 きかん と あ よやく きぼう ひと うらめん かくにん よやく
 機関への問い合わせはしないでください。予約を希望する人は、裏面を確認し予約してく
 ださい。

じょうほう がつ にち きん じてん いりょうきかん ちやうたい ないよう か
 この情報は、4月16日(金)時点のもので、医療機関との調整などによって内容が変わる
 ことがあります。

予約・接種にあたっての注意点等

- 現在、何かの病気で治療中の人や、体調など接種に不安がある人は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。
- 接種前にご自宅で検温し、接種場所ではマスクを着用してください。
(発熱や体調不良がある場合は接種できません。)
- 混雑を防ぐため、予約時間よりも大幅に早く来ることや、接種会場にとどまることはしないでください。
- 接種後15～30分は、様子観察のため接種会場での待機が必要です、時間に余裕をもって来てください。

● 基礎疾患がある人とは

基礎疾患のある人とは、次のいずれかにあてはまる人です(※令和3年4月1日時点の情報のため今後変更となる可能性があります。)

1). 以下の病気や状態の人で、通院/入院している人

- | | |
|--|--|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 2. 慢性の心臓病(高血圧を含む。) | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 3. 慢性の腎臓病 | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が表れた状態(呼吸障害等) |
| 4. 慢性の肝臓病(肝硬変等) | 11. 染色体異常 |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態) |
| 6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |
| 7. 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。) | 14. 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者
保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)
で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持
している場合) |

2). 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の人

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

新型コロナウイルスワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、四條畷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターにご相談ください。

〈お問い合わせ先〉

四條畷市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0570(007)355(ナビダイヤル)

四條畷市 新型コロナウイルス感染症予防接種 予約方法のお知らせ



方法1~4のいずれかで、必ず事前に予約してください

- 予約には接種券に書かれた券番号・市区町村コード・生年月日が必要です。
- 接種希望日の3日前までに予約してください (例. 5月19日であれば5月16日までに予約)
- 接種希望日の3日前までキャンセル可能 (例. 5月19日であれば5月16日までにキャンセル)
- 家族などの代理申し込み可能。

令和3年5月12日 (水) 正午から予約受け付け開始

方法1 ワクチン接種予約サイト

① **ワクチン接種予約サイトにアクセス**
<https://jump.mrso.jp/272299/>
 メールアドレスを登録すると予約完了・キャンセル・接種日前日のお知らせメールがとどきます

② **接種券番号・生年月日で認証**
 市区町村コード
 接種券番号を入力

③ **接種可能な会場一覧から希望する会場(医療機関)を選択**
 接種希望日で会場を絞り込
 会場決定

④ **接種希望日を選択**
 予約カレンダー表示

⑤ **希望時間を選択 ご予約完了!**

※画像はイメージです

方法2 LINE

四條畷市公式LINEアカウントに友だち登録してチャットボット予約

● 友だち登録



市公式LINE

● トーク上で予約



メッセージからチャットボット予約を選択
※登録情報に個人情報含まれません

方法3 電話

四條畷市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話して予約

● 電話番号
 ☎0570(007)355 午前9時~午後5時 (土・日・祝日除く)

5月8日(土)~6月末ごろまでは土・日・祝日も受付

方法4 メール・FAX

言語・聴覚障がい等により電話での相談が難しい人はメール・FAXで予約を受付けます

- メール
corona-vaccine@city.shijonawate.lg.jp
- FAX
 ☎072(877)6963



市ホームページ

FAXの様式は、市ホームページから印刷するか、障がい福祉課窓口で設置

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ALC-0315：[（4-ヒドロキシブチル）アザンジール] ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◆ ALC-0159：2- [（ポリエチレングリコール）-2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の
お薬

抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イクザレルト	リバーロキサバン
エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エトキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名	商品名	一般名
バイアスピリン	アスピリン	コンブラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩	エパデール	イコサペント酸エチル(EPA)
エフィエント	プラスグレル塩酸塩	ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
プレタール	シロスタゾール	アンブラーグ	サルボグレート塩酸塩
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤		など
プリリタ	チカグレロル		