

写し

新型コロナウイルスワクチンに関する電話相談窓口

●岬町におけるワクチン接種の予約・相談

岬町コロナワクチンコールセンター

受付日時:午前9時～午後5時30分(平日)

電話番号:072-468-9935

※現在、予約受付は開始していません。予約開始は4月28日(水曜日)の午前9時00分から(高齢者のみ対象)となっております。

●新型コロナウイルスワクチンに関する総合的な相談について

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

受付日時:午前9時～午後9時(土日祝を含めた全日)

電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)

●副反応等の専門的な相談について

大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口

受付日時:24時間(土日祝を含めた全日)

電話番号:0570-012-336

写し

ワクチン接種に関する同意について

ワクチン接種は強制ではありません。新型コロナウイルスワクチンの接種は、しっかりとした情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

[コロナワクチンの有効性 \(PDFファイル: 140.6KB\)](#)

[コロナワクチンの副反応 \(PDFファイル: 125.8KB\)](#)

ワクチン接種の費用について

接種費用は無料で、自己負担はありません。

「新型コロナウイルスワクチン接種実施プロジェクトチーム」の設置

新型コロナウイルスワクチン接種事業の一環として、本町ではしあわせ創造部福祉課内に「新型コロナウイルスワクチン接種実施プロジェクトチーム」を設置しました。

今後大阪府と調整を行い、新型コロナウイルスワクチン接種事業の速やかな開始に向けて、準備を進めて参ります。

関連ページ

[新型コロナウイルスについて\(厚生労働省\)](#)

[新型コロナウイルスについて\(首相官邸\)](#)

[新型コロナウイルスQ&A\(厚生労働省\)](#)

新型コロナワクチンについて

ワクチンの効果・有効性

ワクチンというものは、感染症に対する免疫をつけたり、強めたりすることで、感染症の社会での流行、個人の発症や重症化を予防します。

新型コロナワクチンでは、発症や重症化の予防効果が期待されています。

現在承認申請されているワクチンは、新型コロナウイルスが人の細胞に入るためのカギとなる、スパイクタンパク質に対する免疫をつくるものです。


このワクチンについて、海外で、実際にワクチンが入っているかどうかを明かさずに、ワクチンの入った注射をしたグループと、ワクチンが入っていない注射をしたグループを比較したデータがあります。

それによると、ワクチンが入った注射をしたグループで、新型コロナウイルス感染症の症状が出た人の数が、ワクチンが入っていない注射をしたグループより、95%少なかったと報告されています。これを有効率95%と言います。

これは、例えば、「ワクチンを打っていない」1万人のグループで100人が発症した場合、「ワクチンを打った」1万人のグループでは発症者を5人に抑えられるということです。

いつものインフルエンザワクチンの有効率が40~60%と報告されていることを考えると、高い効果とされています。

政府としては、できるだけ早期に、安全で効果的なワクチンを皆さまにお届けできるよう、取り組んでいます。



写し

新型コロナワクチンについて

ワクチンの副反応

ワクチンを打ったあと、打った場所の腫れ・痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。

治療を必要としたり、障害が残るほどの重いものは、極めて稀ですが、ワクチンによる何らかの副反応が起こる可能性はゼロではありません。

現在承認申請されている新型コロナウイルスのワクチンについても、打った場所の痛みが66～83%の方にあったことが報告されています。また、38度以上の発熱が、2回目の接種後11～16%の方に発生したと報告されています。

アメリカでは、1月18日までに、ワクチンの接種による急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーが100万人に5人程度報告されています。日本でも、ワクチン接種後に会場で一定時間様子を見て、万が一アナフィラキシーが起こっても、医師や看護師が必要な対応を行うこととしています。

このワクチンの承認にあたっては、国内外のデータを用いて、発症や重症化の予防などワクチン接種のメリットが、副反応のデメリットよりも大きいことを確認していきます。

政府としては、安全性に関する情報を、適切に収集し、国民の皆様に提供していきます。

写し

岬町新型コロナワクチン接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)

ワクチン接種までの流れ

①クーポン券が届きます

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始していきます。接種の順番が来られた方にクーポン券をお送りします。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

②接種指定医療機関の確認・予約

【岬町内の指定医療機関】 ※ワクチン供給の都合上、必ず予約が必要です。

市川クリニック	江川クリニック胃腸肛門科	与田病院
あい整形外科リハビリクリニック	もちづき耳鼻咽喉科	津山医院
なぎさクリニック		



※1 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町内の指定医療機関でも接種可能です。

※2 基礎疾患のある方、何らかの病気等で通院内服中の方、過去の予防接種で、アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等アナフィラキシーを疑わせる複数の症状の既往歴のある方は、かかりつけ医に相談後、予約申し込みをしてください。(かかりつけ医での接種も可能です。)

※3 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町及び岬町の指定医療機関以外でのワクチン接種については、コールセンターにご相談ください。

予約先

岬町コロナワクチンコールセンター **072-468-9935**

インターネット受付 →

<https://vaccines.sciseed.jp/misaki>



LINEの方はこちらへ →

右記の QR コードから岬町公式アカウントを友だち登録してください



※いずれのご予約の際も、お手元にクーポン券をご用意ください。

③ワクチンの接種を受ける

予約した医療機関でワクチンの接種をお受けください。



当日の
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- ・予診票(当日、記入してお持ちください)
- ・おくすり手帳



※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した医療機関にご連絡ください。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのをご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です(令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。)

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ①慢性の呼吸器の病気 | ⑦免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。) |
| ②慢性の心臓病(高血圧を含む。) | ⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| ③慢性の腎臓病 | ⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| ④慢性の肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。) | ⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) |
| ⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | ⑪染色体異常 |
| ⑥血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) | ⑫重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) |
| | ⑬睡眠時無呼吸症候群 |

2. 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方

※BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

※BMI 30の目安:身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を希望される方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を希望される方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを接種できる場合があります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>



◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを接種するかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターにご相談ください。

TEL 0120-761-770



お問い合わせ先

岬町コロナワクチンコールセンター

TEL 072-468-9935



新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。

本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約95%と報告されています。)

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、3週間の間隔) ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上(16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回0.3 mL を合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

(うらへ続く)

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。)
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治療する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製のワクチン)の特徴

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)
添加物	◇ ALC-0315:[(4-ヒドロキシブチル)アザンジール]ビス(ヘキサ-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル) ◇ ALC-0159:2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC:1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。