

65歳以上の秩父郡市にお住まいの皆様へ  
(昭和32年4月1日以前に生まれた方)

秩父郡市内  
どこでも接種できる  
「秩父方式」

## 新型コロナウイルスワクチン接種のご案内



秩父郡市(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀬町、小鹿野町)では、秩父郡市医師会と協力し、どこの接種会場(集団接種会場・個別接種医療機関)でも接種可能です。接種を希望される方は、以下の手順により、予約した上で接種を受けてください。

### ワクチン接種の予約について

#### 1 接種会場、日時の候補を決める

秩父郡市の集団接種会場もしくは個別接種の医療機関のどちらかを選び、接種日程の候補を決めてください  
(接種会場は裏面をご覧ください)

接種費用は  
無料です

#### 2 予約をする(電話もしくはLINE)

※予約開始は4月26日(月)からとなっています。  
※接種予定日の30日前から予約可能です。

予約時には手元に  
「予防接種券」  
を準備してください。  
※接種当日も  
使用します

※予約は接種1回分ずつ行います。

※基礎疾患がある方は、接種についてあらかじめかかりつけ医にご相談ください。

#### 【電話の場合】

①秩父郡市共通のコールセンターに電話をしましょう。

☎ 050-2018-2795  
受付時間 8時30分~17時15分(平日のみ)

②予約したい旨を話し、必要事項を伝えましょう。


●住民票のある市町村

●「クーポン券(接種券)」  
の「券番号」の下6桁

●生年月日

●希望の接種会場、日時

●電話番号



予防接種実施日記録欄  
忘れないよう記録しましょう

|     | 日時         | 会場 |
|-----|------------|----|
| 1回目 | 月 日<br>時 分 |    |
| 2回目 | 月 日<br>時 分 |    |

#### 【LINEの場合】

①右記のQRコードを読み取って、「秩父市」を友達追加します。→→→→

②自動返信でメッセージが来るのでそれに従ってください。

※QRコードが読み取れない方は、LINE IDで「@chichibu\_city」を検索して、友達追加してください。



接種当日は  
肩の出しやすい  
服装でお越しください

### ワクチン接種当日に持参するもの

①「クーポン券(接種券)」…忘れると接種が出来ません。

②「予診票」…予診票は事前に必ず記入をお願いします。

③健康保険証

※万が一、副反応が起きた場合は健康保険証が必要となります。



## ワクチンについて（ファイザー社製）

接種は2回行います。

【接種間隔】 1回目から3週間後に2回目を接種します。  
【接種場所】 上腕の筋肉（肩より少し下）に筋肉注射法という方法で接種します。

※3週間を超えた場合は、出来るだけ早く2回目を接種します。

※1回目の接種が終了したら、2回目の予約を取ってください。

※別紙のファイザー社製のワクチンに関する説明書をよく読んでから接種してください。

## ワクチン接種会場

秩父郡市内の集団接種会場もしくは医療機関を選んでください。

秩父郡市では、秩父郡市医師会と協力し、どこの接種会場（集団接種会場・個別接種医療機関）でも接種可能です。

※1回目と2回目が異なる会場でも接種可能です。

### <集団接種会場>

詳しい会場と日程は、別紙をご確認ください。

### <個別接種の医療機関>

秩父郡市では、秩父郡市医師会と協力し、秩父郡市内の個別接種に協力していただける医療機関で、どこでも接種可能です。詳しくは別紙をご覧ください。

### 【接種を受ける際の同意】

- ①接種については予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けてください。
- ②受ける方の同意なく接種が行われることはありません。
- ③職場や周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることがないようにお願いします。

### 【その他】

- ④ワクチン接種後に健康被害が生じたときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
  - ⑤ワクチン接種による詐欺に注意してください。ワクチン接種に関してお金や個人情報を電話で求めることはありません。
- 出典：厚生労働省ホームページより

### 【その他の問い合わせ】

医学的知見が必要となる専門的な相談は埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口へお問い合わせください。また、ワクチンの詳しい情報については厚生労働省のコールセンターやホームページをご利用ください。

#### <埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口>

☎0570-033-226（24時間、土日祝日も対応）

#### <厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>

☎0120-761770（フリーダイヤル）

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

#### <新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口>

☎0120-565653（フリーダイヤル）

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

問合せ：横瀬町役場 子育て支援課

☎0494-25-0110（直通） FAX：0494-21-5155



## 予約前にお読みください **重要**

・ワクチン接種が不安な方、接種を迷っている方は、かかりつけ医に相談しておきましょう。

### 予約時の注意事項

・これまでにアナフィラキシー(重度のアレルギー反応)を起こしたことのある方は、コールセンターに連絡し、秩父市立病院、秩父病院、小鹿野中央病院、皆野病院で接種の予約をしてください。

またその旨を予約した病院へもご連絡ください。

なお当日の予診で接種できない場合がありますのでご了承ください。

・接種部位の痛み、頭痛、発熱、関節痛、疲労感などの副反応が頻繁に起こります。通常は2日以内におさまりますが、仕事の調整をしてから予約してください。

・帰宅後の体調不良には、接種医療機関、かかりつけ医、休日診療所、休日当番医療機関、救急病院等が対応しますので、ご安心ください。

・秩父郡市医師会のホームページに、地元医師会員等のワクチン接種後アンケート、副反応情報、注意事項、写真、動画などがわかりやすく掲載されています。是非、接種前にご覧ください。

秩父郡市医師会ホームページ



医師会と1市4町で、「ちちぶワクチン推進会議」を実施し協議しています。

ちちぶワクチン推進会議

秩父郡市医師会 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀬町 小鹿野町

# 新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

|         |  |
|---------|--|
| 販売名     | コミナティ <sup>®</sup> 筋注                    |
| 効能・効果   | SARS-CoV-2 による感染症の予防                     |
| 接種回数・間隔 | 2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種                    |
| 接種対象    | 16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。） |
| 接種量     | 1回0.3 mLを合計2回                            |

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

| 有効成分 | ◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）              |
|------|---|
| 添加物  | ◇ ALC-0315：[（4-ヒドロキシブチル）アザンジル]ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル） |
|      | ◇ ALC-0159：2- [（ポリエチレングリコール）-2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド           |
|      | ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン                             |
|      | ◇ コレステロール   |
|      | ◇ 塩化カリウム  |
|      | ◇ リン酸二水素カリウム  |
|      | ◇ 塩化ナトリウム   |
|      | ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物  |
|      | ◇ 精製白糖  |

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

## 血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、  
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

### 接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の  
お薬

### 抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

| 商品名    | 一般名            |
|--------|----------------|
| ワーファリン | ワルファリンカリウム     |
| プラザキサ  | ダビガトランエテキシラート  |
| イグザレルト | リバーロキサバン       |
| エリキュース | アピキサバン         |
| リクシアナ  | エドキサバントシル酸塩水和物 |

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、  
通常どおり接種を受けていただけます。

### 抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

| 商品名     | 一般名               | 商品名         | 一般名              |
|---------|-------------------|-------------|------------------|
| バイアスピリン | アスピリン             | コンブラビン配合錠   | アスピリン・クロピドグレル硫酸塩 |
| パナルジン   | チクロピジン塩酸塩         | タケルダ配合錠     | アスピリン・ランソプラゾール   |
| プラビックス  | クロピドグレル硫酸塩        | エパデール       | イコサペント酸エチル(EPA)  |
| エフィエント  | プラスグレル塩酸塩         | ドルナー、プロサイリン | ベラプロストナトリウム      |
| プレタール   | シロスタゾール           | アンブラーグ      | サルボグレレート塩酸塩      |
| バファリン   | アスピリン・ダイアルミネート配合剤 |             | など               |
| ブリリント   | チカグレロル            |             |                  |