

# 江南市

## 新型コロナワクチン 接種のお知らせ



### ワクチン接種までの流れ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

## ① 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

## ② 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>



「コロナワクチンナビ」  
二次元コード

※医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。  
住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。

## ③ 予約して、ワクチンを受ける (予約方法は同封チラシ参照)

当日の持ち物	<ul style="list-style-type: none"><li>・予診票(ご自宅でご記入の上お持ちください)</li><li>・接種券(このお知らせに同封されています)</li><li>・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)</li></ul>
--------	--

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封された接種券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

※新型コロナウイルスワクチンの接種は、市民の皆様に受けさせていただくようにお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

また、予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意志で接種を受けていただきます。

受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

※職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。



## ◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

## ◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年3月18日時点）。

### 1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病  
又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）

8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

### 2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30 の目安：身長 170 cm で体重 87 kg、身長 160 cm で体重 77 kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

## ◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。  
コロナワクチンナビでご確認いただきか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

## ◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報  
については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、下記コールセンターにご相談ください。

予約  
お問合せ先

## 江南市 新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター

（この事業は株式会社近畿日本ツーリスト中部が受託しています）

TEL. 0587-50-0150 受付時間：  
平日及び土日 8:30～17:00（祝日は対応できません）

江南市 健康づくり課（保健センター）新型コロナウイルス感染症対策グループ

## ① 接種場所を決め、予約をする

85歳以上の方

◎お電話にて  
予約をして  
ください。

入荷するワクチン（先行分）がおよそ500人分と少量のため、  
当面の間はKTXアリーナ内サブアリーナのみの実施となります。

江南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

（この事業は株式会社近畿日本ツーリスト中部が受託しています）

電話番号 **0587-50-0150**

受付時間 平日及び土日8:30～17:00（祝日は対応できません）

**※予約受付開始日:4月22日（木）**

先行分（5月13日（木）まで）はお電話のみの予約となります。

65歳以上  
85歳未満の方


◎今後のワクチンの入荷状況等にあわせ、ご案内をしますので、  
広報（5月号）や、江南市のホームページにてご確認ください。

・Web予約の方法、個別接種会場（市内協力医療機関）など

## ② 接種当日、会場へ行く

- ・予診票に記入してから、会場へお越しください。
- ・密を防ぐため、ご来場は時間厳守でお願いいたします。
- ・受付時は本人確認、検温、接種券や予診票の確認を行います。  
またマスク着用でのご来場にご協力ください。  
(当日明らかに発熱している人（通常37.5℃以上）は接種できません。)
- ・接種部位（上腕）を速やかに露出できる服装（半袖など）でお越しください。

持ち物：接種券、予診票、本人確認書類、スリッパ（必要な方のみ）



接種部位



※ 長袖だと  
袖がまくれず、  
肩が出ません！

## ③ 接種を受ける

医師による問診ののち、ワクチン接種を行います。

接種後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は30分以上）接種を受けた会場でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には速やかにお申し出ください。



# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ ALC-0315：[（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル]ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◆ ALC-0159：2-[（ポリエチレングリコール）-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



# 新型コロナウイルスワクチン

## 接種のお知らせ

新型コロナウイルス感染症はいまだ収束の目途が立たない状況です。新型コロナウイルス感染症による死者や重篤者を減らし、そのために必要な医療を確保し、感染拡大を防止させることを目的として、全国民を対象としたワクチン接種が始まります。

対象 市民（原則として住民票のある市町村で接種します） 接種費用 無料 接種回数 2回（ファイザー社ワクチンの場合）

接種方法 集団接種、個別接種 ※接種には事前予約が必要です。

### 接種場所 集団接種会場

- ・KTXアリーナ内サブアリーナ
- ・江南市保健センター

### 個別接種会場（市内協力医療機関）

※決まり次第ホームページなどでお知らせいたします。

※接種開始日や接種会場の詳細につきましては、後日送付する接種券の同封書面やホームページなどによりお知らせいたします。

### 接種スケジュール（予定）

65歳以上の方から4月中旬より順次接種券を送付し、接種を開始していく予定です。その他の方につきましては、順次ご案内いたします。なお、16歳未満の方への接種は、国の方針が決まり次第お知らせいたします。

	4月中旬～	4月下旬～	順次
65歳以上の方	接種券配布	接種	
基礎疾患のある方		接種券配布	接種
高齢者施設従事者		接種券配布	接種
その他の方		接種券配布	接種



【注意】愛知県内で、新型コロナウイルスワクチン接種に関する特殊詐欺に繋がる不審な電話が確認されています。ワクチン接種に「予約金」など費用が発生することはありません。不審な電話は、すぐに切りましょう！

### 江南市 新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター

（この事業は株式会社近畿日本ツーリスト中部が受託しています）

電話番号 **0587-50-0150**

受付時間 3/15(月)～4/16(金)の期間… 平日 8:30～17:00 (土日祝日は対応できません)  
4/17(土)以降… 平日及び土日 8:30～17:00 (祝日は対応できません)

接種予約は、接種券がお手元に届いてからとなります。国の定める接種順位に従い、順次接種券を発送いたしますので、しばらくお待ちください。

江南市 健康づくり課（保健センター）新型コロナウイルス感染症対策グループ

予約・お問合せ先



# 新型コロナワクチンについて皆さんに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～

令和3年2月19日時点 首相官邸・厚生労働省チラシ及び厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」より抜粋

## ●新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。

今回新たに承認された新型コロナワクチンは2回の接種によって、95%の有効性で、発熱やせきなどの症状が出ること（発症）を防ぐ効果が認められています。  
(※インフルエンザワクチンの有効性は約40～60%)

## ●新型コロナワクチンは、あなたご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

新型コロナワクチンは、まだまだ未知のことがあります。このウイルスの感染により、令和3年1月末までに6千人以上の方が亡くなり、3万人以上の方が入院されています。特効薬も開発中の段階です。

こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。

## ●どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。(※予防接種による健康被害は救済制度の対象です。)

今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを2回接種後に、接種部位の痛みは約80%に、37.5度以上の発熱が約33%、疲労・倦怠感が約60%の方に認められています。

ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で100万人に5人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15～30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

## ●ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう。

新型コロナワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。国民の皆さまが納得して判断をしていただけるよう、国としても情報提供に努めてまいります。

## Q.ワクチンを接種した後は、日常生活でのマスクの着用は必要な？

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されますが、ワクチンを受けた方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。このため、引き続き、皆さんに感染予防対策を継続していただけようお願いします。具体的には、「3つの密<sup>※1</sup>」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。(※1 密集・密接・密閉)

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号：0120-761-770 受付時間：午前9時から午後9時（土日・祝日も実施）